食道がん

【フルオロウラシル＋シスプラチン療法（放射線療法なし）】

【FP-RT療法】

【ドセタキセル＋シスプラチン＋フルオロウラシル療法】

【分割DCF療法】

【ニボルマブ単独療法】

【パクリタキセル単独療法】

【Weekly PTX療法】

【ニボルマブ+イピリムマブ療法】

【フルオロウラシル＋シスプラチン療法（放射線療法なし）】

【FP-RT療法】

適応疾患：補助化学療法・切除不能進行・再発食道がん

投与スケジュール：1クール28日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）　（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン	80mg/m^2	120分	●																											
フルオロウラシル	800mg/m^2	24時間	●	●	●	●	●																							

【ドセタキセル＋シスプラチン＋フルオロウラシル療法】

【分割DCF療法】

適応疾患：切除不能進行・再発食道がん

投与スケジュール：1クール28日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）　（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ドセタキセル	30mg/m^2	60分	●														●													
シスプラチン	80mg/m^2	60分	●																											
フルオロウラシル	800mg/m^2	22時間	●																											
フルオロウラシル	800mg/m^2	24時間		●	●	●	●																							

【ニボルマブ単独療法】

適応疾患：切除不能進行・再発食道がん

投与スケジュール：1クール14日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）　（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ニボルマブ	240mg/body	30分	●													

【パクリタキセル単独療法】

【Weekly PTX療法】

適応疾患：切除不能進行・再発食道がん

投与スケジュール：1クール49日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）　（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	100mg/㎡	60分	●							●							●							●						

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
●							●													

【ニボルマブ+イピリムマブ療法】

適応疾患：切除不能進行・再発食道がん

投与スケジュール：1クール42日

使用抗がん剤と治療のスケジュール（●は投与日）　（副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	推奨投与量	投与時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ニボルマブ	360mg/body	30分	●																					●						
イピリムマブ	1mg/kg	30分	●																											

			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ニボルマブ	360mg/body	30分														
イピリムマブ	1mg/kg	30分														